

子宮頸 抹片檢查

Pap Smear

\$616

EOT00701

快捷而簡單地
篩查子宮頸癌



念珠菌及 滴蟲塗片檢查

Trichomonas & Monilia (T&M) Smear

\$231

EOT15801

及早檢測
預防陰道炎來襲!



LM20250625

子宮頸抹片檢查（又名柏氏抹片檢查，英文為Pap Smear）是現時最有效篩查子宮頸癌的方法，可以快捷而簡單地檢測子宮頸細胞異常。



子宮頸抹片檢查是一種能夠發現子宮頸細胞早期異常變化的簡單測試，發現異常的話，醫生可以及早作出適當的處理，防止這些不正常細胞進一步發展成具侵略性的子宮頸癌。數據顯示，柏氏抹片定期檢驗，**能預防90%以上的子宮頸癌**。



LM20250625

哪些女性需要抹片檢查？ 多久一次？

有性經驗的女性應該由25歲起，開始定期接受子宮頸癌檢查。HPV疫苗並不能預防所有類型的HPV感染，所以即使已經接種HPV疫苗，仍建議定期進行檢查。

如果第一次檢查結果正常，建議在一年後進行第二次檢驗。如果第二次檢驗結果正常，就可以每三年進行一次檢查。根據衛生署引述國際癌症研究機構 (International Agency for Research on Cancer) 的研究顯示，子宮頸檢查越頻密，發病率的減幅亦會越大：



普查頻率	累積發病率的減幅
1年一次	93.5%
2年一次	92.5%
3年一次	90.8%
5年一次	83.6%
10年一次	64.1%



抹片檢查前需知


在檢查前48小時內，應避免進行以下活動，以免沖走不正常細胞，包括：

- 灌洗陰道
- 使用殺精藥、陰道塞藥
- 性交


月經時亦不應接受檢驗。如果出現不正常陰道分泌或發炎，應先治療陰道感染，再接受子宮頸檢查。



子宮頸細胞檢驗是一項非常安全的測試，過程只需幾分鐘。



將「窺器」放入陰道內




透過「窺器」於子宮頸的表面抽取一些細胞樣本



完成後便可抽出「窺器」



樣本會被送到化驗室，在顯微鏡下進行測試



在子宮頸細胞檢查期間，如果你能放鬆，你應該不會感到痛楚。但有些女性可能會感到輕微不舒服，可以慢慢地深呼吸來減輕不適。如果你在檢查期間覺得非常不舒服，應告訴醫生或護士及要求停止檢驗。



陰道炎是婦女常見病症，任何年齡的女性都有機會患上。常見的陰道炎多由念珠菌及滴蟲引起，但其他的細菌也可引起陰道炎。婦女在收經後，體內的女性荷爾蒙水平下降，亦會較容易患上陰道炎。

陰道炎會令陰道及陰道分泌物出現異常情況，包括：

白帶流量突然增加

白帶轉為黃、綠色、帶臭，或帶血

外陰痕癢、疼痛、紅腫

小便時有灼痛的感覺



LM20250625

念珠菌陰道炎

念珠菌陰道炎的常見症狀是外陰灼熱痕癢、疼痛、下陰流出白色黏稠分泌物，並在性交時感到疼痛，症狀多發生在生理期前，陰道分泌物呈現乾乳酪狀。若出現以上的徵狀，應盡快延醫診治。常用的治療藥物有陰道塞劑及口服藥，均需經醫生處方。

滴蟲陰道炎

滴蟲是一種單細胞原蟲，主要經性接觸傳播。潛伏期由四天至二十天不等。女性受滴蟲感染後，約半數並無任何病徵，有些則會因而患上陰道炎，患者會感到陰道痕癢和陰道分泌增多，白帶呈黃綠色和帶臭，會伴隨排尿困難、性交疼痛或是下陰搔癢感覺。患上滴蟲陰道炎者除了要及早治理外，還應檢查有沒有感染其他性病，其性伴侶亦應接受檢查和治療，以免反覆傳染。



LM20250625