

保護再升級 全新20價肺炎球菌結合疫苗



均覆蓋入侵性較強的
血清3型及抗藥性較高的
血清6A、19A和19F型。

多個發達國家首選/建議
**20價肺炎球菌
結合疫苗**

美國	加拿大	澳洲	西班牙
德國	比利時	波蘭	捷克 共和國

一針見效
無需補打

最新、覆蓋最廣泛
的結合疫苗

誘導免疫記憶，
提供長效保護

有效針對
20種肺炎球菌
包括血清3型

FDA

已獲美國FDA
及歐盟批准

*資料數據由Pfizer輝瑞提供



肺炎小知識

肺炎是香港第二大死因，僅次於癌症，比心臟病及腦血管疾病更加致命，
過去20年死亡人數上升超過2倍。



肺炎球菌併發症



肺炎



腦膜炎



敗血病/
菌血症



中耳炎



鼻竇炎




在2022年，約50%的入侵性肺炎球菌個案均來自65歲長者。即使有適當治療，超過50%會有長遠後遺症。

高危一族



慢性肺炎
疾病患者
6.2-9.8倍



心血管疾
病患者
2.9-5.1倍



65歲或
以上人士
4.8倍^



吸煙者
3.0-4.4倍



糖尿病
患者
2.5-3.1倍



50-64歲
人士
1.4倍^

肺炎小知識

傳播途徑：

飛沫、觸摸被細菌污染的物件或與患者親密接觸

肺炎症狀



胸口痛



呼吸困難



發燒



打冷顫



冒汗



疲倦



噁心嘔吐



持續咳嗽



神智混亂



全港最新最廣覆蓋、一針免補打

全新20肺炎球菌結合疫苗

- ▶ 針對較多肺炎菌血清型，包括血清3型，有助抵禦世界各地流行的肺炎球菌
- ▶ 可誘導持久的免疫記憶，提供長久保護

目前有三種肺炎球菌結合疫苗^{1,25,26}：


血清型	1	3	4	5	6A	6B	7F	9V	14	18C	19A	19F	23F	22F	33F	8	10A	11A	12F	15B
20價肺炎球菌結合疫苗	■					■	■	■					■	■	■	■				
15價肺炎球菌結合疫苗		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
13價肺炎球菌結合疫苗	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

它們有甚麼分別？

20價基於13價疫苗技術研發，覆蓋額外7種血清型，比15價提供多30%覆蓋。

如何防範肺炎球菌感染？

侵入性肺炎年長患者*的肺炎球菌血清型佔比¹⁶⁻²⁸



防範肺炎球菌

接種時間表



曾接種的疫苗

從未接種[†]



建議

接種 **20價結合疫苗**

只接種過 **13價結合疫苗**
或 **23價多醣疫苗**

相隔1年後

補種 **20價結合疫苗**

曾接種 **13價結合疫苗** 及

一針或兩針

23價多醣疫苗 [§]

在65歲前接種了

23價多醣疫苗

在65歲或以後接種了

23價多醣疫苗

相隔5年後

補種 **20價結合疫苗**

相隔5年後
(並與醫護人士商討過)

可補種 **20價結合疫苗**



肺炎球菌疫苗可否與其他疫苗同時接種？

其他疫苗 可同時接種

新冠疫苗

流感疫苗
長者同時接種流感及肺炎球菌疫苗與較低肺炎及死亡風險有關。

帶狀疱疹疫苗 (蛇針)
獲美國疾病控制及預防中心與澳洲政府衛生和老年護理部建議可同時接種。詳情請向醫生查詢。

HPV疫苗
根據美國疾病控制及預防中心指引，可同時接種兩種或以上的滅活疫苗（如肺炎球菌及HPV疫苗）。詳情請向醫生查詢。

肺炎球菌疫苗常見問題

1. 接種 疫苗後可能 會有甚麼副 作用？

- 常見注射部位會出現輕微腫脹及疼痛，但大部分反應會在兩天內消退，而部分人士可能會出現輕微發熱、疲勞、頭痛、發冷或肌肉疼痛。
- 如不適持續或加劇，請儘快求醫。

2. 接種過 其他肺炎球菌疫 苗，可以再接種 20價疫苗嗎？

- ✓ 只接種過一劑13價或23價疫苗的成年人，可考慮於一年後接種20價疫苗。
- ✗ 目前尚未有接種15價疫苗後需再接種20價疫苗的建議。

3. 曾接種 20價肺炎疫苗， 還需要補打23 價疫苗嗎？

- ✗ 不用。接種20價結合疫苗後無需接種23價多醣疫苗。

